

ИНСТРУКЦИЯ
по применению Кламоксила LA для лечения
бактериальных инфекций у крупного и мелкого рогатого скота,
свиней, собак и кошек
(организация-производитель “Pfizer Italia S.r.l.”/ “Пфайзер Италия S.r.l.”, Италия)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Кламоксил LA (Clamoxyl LA).
2. Кламоксил LA – антибактериальное лекарственное средство в форме суспензии для инъекций, содержащее в качестве действующего вещества амоксициллина тригидрата - 15% (150 мг амоксициллина в 1 мл) и вспомогательные вещества (алюминия стеарат и фракционированное кокосовое масло).
3. Препарат по внешнему виду представляет собой стерильную суспензию белого или светло-кремового цвета.
4. Кламоксил LA выпускают расфасованным в стеклянные флаконы объемом 100 мл. Каждый флакон маркируют с указанием названия, назначения и состава препарата, фирмы изготовителя, условий хранения, серии и срока годности препарата, надписей «для животных» и «стерильно». Флаконы упаковывают по 6 штук в картонные коробки, которые маркируют с указанием названия, назначения и состава препарата, фирмы изготовителя, условий хранения, серии и срока годности препарата, надписей «для животных» и «стерильно».
5. Хранят препарат с предосторожностью (список Б), в защищенном от света месте при температуре от 3°C до 25°C. Срок годности препарата при соблюдении условий хранения составляет 3 года со дня изготовления. Срок хранения вскрытого флакона – 28 дней. Запрещается применять Кламоксил LA после истечения срока годности.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6. Амоксициллин, входящий в состав Кламоксила LA, является полусинтетическим пенициллиновым антибиотиком широкого спектра действия, оказывающим бактерицидное действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии. Антибактериальное действие амоксициллина обусловлено ингибированием синтеза клеточной стенки бактерии.
7. Амоксициллин хорошо всасывается из места инъекции и проникает во все органы и ткани животного. Максимальная концентрация антибиотика в крови отмечается через 2 часа после внутримышечного или подкожного введения препарата и сохраняется на терапевтическом уровне в течение 48 часов.
8. Кламоксил LA по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным соединениям (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

9. Кламоксил LA применяют для лечения крупного и мелкого рогатого скота, свиней, собак и кошек при:
 - инфекционных заболеваниях желудочно–кишечного тракта (включая энтериты);
 - инфекционных заболеваниях дыхательных путей (включая пневмонии и бронхопневмонии у молодняка);
 - инфекционных заболеваниях мочеполовой системы (включая циститы и метриты);
 - некробактериозе, ранах, абсцессах, воспалениях суставов, пупочных инфекциях и других заболеваниях кожи и мягких тканей;
 - атрофическом рините и ММА (метрит, мастит, агалактия) у свиней;
 - для профилактики хирургических послеоперационных инфекций.

10. Препарат вводят внутримышечно или подкожно в дозе 1 мл на 10 кг живой массы (15 мг на 1 кг живой массы), но не более 20 мл в одно место. При необходимости Кламоксил LA вводят повторно через 48 часов.

11. При назначении Кламоксила LA в соответствии с инструкцией побочных явлений и осложнений не отмечается. В редких случаях у отдельных животных возможно развитие отека на месте введения препарата, который рассасывается в течение 1- 2 дней. В случае индивидуальной чувствительности животных к беталактамным антибиотикам возможно развитие аллергических реакций. В этом случае лекарственное средство отменяют и назначают антигистаминные препараты.

11. Нельзя смешивать Кламоксил LA в одном шприце с другими лекарственными средствами. Совместимость препарата с другими лекарственными средствами не отличается от других антибиотиков группы пенициллина.

12. После введения животным Кламоксила LA молоко можно использовать для пищевых целей через 96 часов после последнего введения препарата. Молоко, полученное до истечения указанного срока, может быть использовано после кипячения для кормления животных. Убой крупного и мелкого рогатого скота, а также поросят весом до 50 кг на мясо для пищевых целей можно проводить через 28 дней после последнего введения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, может быть использовано для кормления пушных зверей или для производства мясо-костной муки.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

13. При применении Кламоксила LA следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. После работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Запрещается во время работы принимать пищу и воду.

14. Запрещается использование пустых флаконов из-под препарата для бытовых целей.

15. Хранить Кламоксил LA в местах не доступных для детей.

Инструкция разработана компанией “Пфайзер” (США).

Организация-производитель: Pfizer Italia S.r.l., Borgo san Michele (LT) ss 156km50 – Latina, Italy.

Рекомендован к регистрации ФГУ “ВГНКИ”.

Регистрационный номер: ПВИ-2-1.3/01343