

**Общие сведения:** Римадил Р таблетки (20, 50 и 100 мг) – Rimadyl Palatable Tablets 20, 50 and 100 mg

**Состав:** Римадил Р – нестероидное противовоспалительное лекарственное средство в форме таблеток для перорального применения, содержащих в качестве действующего средства карпрофен – 20 мг, 50 мг или 100 мг в таблетке, а в качестве вспомогательных веществ высушенный распылением порошок свиной печени, гидролизированный растительный белок, кукурузный крахмал, кондитерский сахар, глюкозный сироп, желатин тип А, магния стеарат, и лактозы моногидрат.

**Лекарственная форма:** По внешнему виду Римадил Р со вкусом печени представляет таблетки светло-коричневого цвета с вытисненной буквой “R” с одной стороны таблетки и разделительной бороздкой на другой стороне.

**Упаковка, условия хранения, срок годности:** Римадил Р таблетки со вкусом печени по 20, 30, 50, 60, 100 или 180 таблеток упаковывают во флаконы квадратной формы из полиэтилена высокой плотности белого цвета с полипропиленовой крышкой, недоступной для открывания детьми. Каждый флакон на русском языке маркируют с указанием названия лекарственного средства, названия организации-производителя и ее адреса, наименования и содержания действующего вещества, назначения, условий хранения, номера серии, даты изготовления и срока годности, надписью «Для животных». Хранят с предосторожностью (список Б), в сухом, темном и недоступном для детей месте при температуре от 0 до 25 °С. Срок годности 3 года со дня изготовления при условии хранения в заводской упаковке. Не применять Римадил Р после истечения срока годности.

**Фармакологические свойства:**

Карпрофен, действующее вещество Римадила Р, относится к группе нестероидных противовоспалительных препаратов, и обладает противовоспалительным, анальгетическим и жаропонижающим действием.

Карпрофен, как и другие нестероидные противовоспалительные препараты, ингибирует циклоксигеназу в цикле арахидоновой кислоты. При этом препарат преимущественно влияет на циклоксигеназу-II, которая индуцируется в ответ на развитие воспаления. В результате блокируется синтез воспалительных простагландинов, вызывающих воспаление, отек и боль. В терапевтических дозах карпрофен значительно слабее действует на циклоксигеназу-I, и благодаря этому не оказывает влияния на синтез протективных простагландинов. Таким образом, карпрофен не препятствует нормальным физиологическим процессам в тканях, особенно в желудке, кишечнике, почках и тромбоцитах. Карпрофен быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, достигает пика концентрации в плазме крови через 1-3 часа после введения, при биодоступности более 90%. Время полувыведения у собак составляет около 8 часов. Карпрофен более чем на 99% связывается с белками плазмы. Метаболизируется препарат в печени, выделяется главным образом с фекалиями (около 80%), и с мочой.

**Порядок применения, показания, доза, возможные побочные явления,**

**противопоказания:** Римадил таблетки со вкусом печени назначают при воспалительных и болевых явлениях, возникающих при острых и хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Римадил таблетки также применяют для анальгезии и в качестве противовоспалительного средства для уменьшения послеоперационных болей и отеков. Римадил таблетки со вкусом печени применяют перорально в начальный период лечения в суточной дозе 4 мг карпрофена на 1 кг массы тела. Рекомендуется разделить суточную дозу на две равные части. После 7 дней лечения в зависимости от клинических показаний суточную дозу можно уменьшить до 2 мг/кг массы тела.

При заболеваниях опорно-двигательного аппарата, продолжительность лечения зависит от состояния животного и под контролем ветеринарного врача может продолжаться в течение всей жизни животного. Не следует превышать установленную дозу. Как и при применении других нестероидных противовоспалительных препаратов после применения

Римадила Р у отдельных животных, в редких случаях может возникать раздражение желудка и рвота. Запрещается применять Римадил щенным сукам.

Не назначать другие нестероидные противовоспалительные средства или нефротоксичные препараты ранее, чем через 24 часа после введения Римадила Р. Римадил Р, как и другие нестероидные противовоспалительные средства, следует назначать с осторожностью животным с заболеваниями сердца, почек и печени.

**Меры личной профилактики:** При работе с Римадилом Р следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Как и при применении любых других лекарственных средств, после работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

Запрещается во время работы принимать пищу и воду.

Регистрационный номер - ПВИ-2-7.6/02083