

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Тронцила-К для дегельминтизации кошек

(организация-разработчик: ООО «Ветбиохим»,
105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер., 3/9, стр. 2)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Тронцил-К (Troncil-K).
Международное непатентованное наименование: празиквантел, пирантел эмбонат.
2. Лекарственная форма: таблетки для орального применения.
Тронцил-К в качестве действующих веществ в 1 таблетке содержит празиквантел – 20 мг и пирантел эмбонат – 230 мг, а также вспомогательные вещества: лактозу, микрокристаллическую целлюлозу, поливинилпиролидон, магния стеарат, натрия лаурилсульфат, аэросил и крахмал картофельный.
3. По внешнему виду препарат представляет собой таблетки от белого до светло-желтого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня производства.

Запрещается использовать Тронцил-К по истечении срока годности.

4. Выпускают Тронцил-К расфасованным по 2, 4, 6, 8, 10 таблеток в контурные блистеры; по 10, 20, 50 таблеток в пластиковые контейнеры или стеклянные флаконы, которые упаковывают поштучно в картонные пачки. Блистеры по 10 таблеток упаковывают в картонные пачки по 1, 2 и 5 штук. Каждая потребительская упаковка снабжается инструкцией по применению.
5. Хранят Тронцил-К в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0°C до 20°C .
6. Тронцил-К необходимо хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Тронцил-К относится к комбинированным антигельминтным препаратам.
10. Комбинация входящих в состав препарата празиквантера и пирантера эмбоата обеспечивает широкий спектр его антигельминтного действия на все фазы развития круглых и ленточных гельминтов, паразитирующих у кошек: Toxocara cati, Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Mesocestoides spp., Joyeuxiella sp.

Механизм действия препарата основан на нарушении транспорта глюкозы и микротубулярной функции паразита, ингибирование фумаратредуктазы и синтеза

АТФ, увеличение проницаемости клеточных мембран, что приводит к нарушению мышечной иннервации, параличу, гибели паразита и способствует его элиминации из желудочно-кишечного тракта.

После перорального введения препарата празиквантел легко всасывается в желудочно-кишечном тракте, достигая максимальной концентрации в плазме крови через 1-4 часа, и распределяется в органах и тканях животного; выводится из организма в основном с мочой (до 80%) в течение 24 часов.

Пирантел эмбоат плохо всасывается, что обеспечивает его пролонгированное действие на гельминтов в кишечнике; выводится из организма в основном в неизмененном виде с фекалиями (93%).

Тронцил К по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендованных дозах не оказывает сенсибилизирующего, эмбриотоксического и тератогенного действия.

III. Порядок применения

11. Тронцил-К назначают кошкам для профилактики и лечения нематодозов (токсокароз, анкилостомоз) и цестодозов (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкозы).

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата (в том числе в анамнезе). Тронцил-К не следует применять истощенным, больным инфекционными болезнями и выздоравливающим животным, беременным и кормящим кошкам, котятам моложе 3-х недельного возраста.

13. Препарат применяют кошкам с 3-недельного возраста индивидуально однократно в дозе 1 таблетка на 3-4 кг массы животного, из расчёта:

Масса животного	Доза Тронцила-К
до 1 кг	1/4 таблетки
от 1 до 2 кг	1/2 таблетки
от 2 до 3 кг	3/4 таблетки
от 3 до 4 кг	1 таблетка
от 4 до 5 кг	1+1/4 таблетки

Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется.

Препарат задают животным принудительно или с кормом, помещая таблетку в кусок мяса, фарш или колбасу.

В случае отказа животного от корма с препаратом, а также котятам Тронцил-К вводят принудительно на корень языка или в виде водной суспензии с помощью шприца или катетера.

С профилактической целью животных дегельминтизируют 1 раз в 3 месяца в терапевтической дозе, с лечебной целью – по показаниям. Рекомендуется также применять Тронцил-К за 10-14 дней перед вакцинацией, случкой и за 3 недели до предполагаемого окота.

14. При передозировке препарата у животного может наблюдаться угнетенное состояние, отказ от корма, избыточное слюноотделение, рвота, расстройство желудочно-кишечного тракта.

15. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Тронцил-К не следует применять беременным и кормящим кошкам, котятам моложе 3-х недельного возраста. Дегельминтизацию беременных и кормящих кошек,

при необходимости, проводят после консультации с ветеринарным врачом, за 3 недели до предполагаемого окота и через 2-3 недели после окота.

17. Следует избегать нарушений рекомендуемых сроков дегельминтизации животных, так как это может привести к снижению эффективности. В случае пропуска очередной дегельминтизации препарат необходимо ввести как можно скорее в той же дозе, далее интервал между введениями препарата не изменяется.

18. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата и появлении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Тронцил-К не следует применять одновременно с пиперазином и средствами, ингибирующими холинэстеразу.

20. Тронцил-К не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Тронцилом-К следует соблюдать общие правила личной гигиены и безопасности, предусмотренные для работы с лекарственными средствами.

22. Во время работы с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с моющим средством.

23. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Тронцилом-К. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

Наименование, адрес организации, ООО «Ветбioxим», 355019,
уполномоченной держателем или г. Ставрополь, ул. Биологическая, 18.
владельцем регистрационного 3/9, стр. 2.
удостоверения лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Тронцила-К для дегельминтизации кошек, утвержденная Россельхознадзором 12 марта 2012 г.

Номер регистрационного удостоверения 74-3-2.12-0570 n ПБР-3-3.3/01246